



ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА

ПРОТОЗИДИМ

Цефтазидим

порошок для приготовления раствора для внутривенного и
внутримышечного введения 0,25 г, 0,5 г, 1,0 г, 2,0 г

АО «Фармасинтез», Россия

Изменение № 1 140420

Дата внесения изменения «__» 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
<p>Форма выпуска Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 0,25 г, 0,5 г, 1,0 г, 2,0 г.</p> <p>Первичная упаковка лекарственного препарата. По 0,25 г, 0,5 г, 1,0 г или 2,0 г препарата в стеклянные флаконы типа I (USP/EP) вместимостью от 10 до 30 мл, герметично закупоренные резиновыми пробками, обжатыми алюминиевыми колпачками с предохранительными пластмассовыми крышечками. На каждый флакон наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей, или из полимерных материалов, самоклеящуюся.</p> <p>Вторичная упаковка лекарственного препарата. По 1, 5, 10, 15, 25, 50, 100 флаконов с препаратом вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона с перегородками для потребительской тары подгрупп хромовый или хром-эрзац, или</p>	<p>Форма выпуска Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 0,25 г, 0,5 г, 1,0 г, 2,0 г.</p> <p>Первичная упаковка лекарственного препарата. По 0,25 г, 0,5 г, 1,0 г или 2,0 г препарата в стеклянные флаконы типа I (USP/EP) вместимостью от 10 до 30 мл, герметично закупоренные резиновыми пробками, обжатыми алюминиевыми колпачками с предохранительными пластмассовыми крышечками. На каждый флакон наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей, или из полимерных материалов, самоклеящуюся.</p> <p>Вторичная упаковка лекарственного препарата. По 1, 5, 10, 15, 25, 50, 100 флаконов с препаратом вместе с инструкцией по применению помещают в пачку (если флаконов более одного – пачка с перегородками) из картона для</p>

<p>другого аналогичного качества. Пачки помещают в групповую упаковку.</p> <p>От 1 до 100 флаконов с препаратом и равным количеством инструкций по применению помещают в картонную коробку (для стационаров). На картонную коробку наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей или из полимерных материалов, самоклеящуюся.</p>	<p>потребительской тары подгрупп хромовый или хром-эрзац, или другого аналогичного качества. Пачки помещают в групповую упаковку.</p> <p>От 1 до 100 флаконов с препаратом и равным количеством инструкций по применению помещают в картонную коробку (если флаконов более одного – коробка с перегородками) (для стационаров). На картонную коробку наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей или из полимерных материалов, самоклеящуюся.</p>
--	--

Вице-президент по качеству и
регуляторным вопросам
АО «Фармасинтез»



Малых Н.Ю.