

## ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА,

принимающего препарат Барицитиниб Фармасинтез, таблетки,  
покрытые пленочной оболочкой, 2 мг и 4 мг

*Эта Памятка предназначена для пациентов, которым назначен препарат  
Барицитиниб Фармасинтез*

Эта Памятка для пациента содержит в себе важную информацию о безопасности препарата Барицитиниб Фармасинтез. Если Вы не совсем понимаете эту информацию, попросите Вашего врача объяснить Вам.

Держите эту Памятку при себе и показывайте ее любому врачу, принимающему участие в Вашем лечении, включая стоматологическое. Если Вы прекратите принимать препарат Барицитиниб Фармасинтез, держите эту Памятку при себе в течение как минимум 2 месяцев после приема последней дозы препарата Барицитиниб Фармасинтез.

Пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом и внимательно ознакомьтесь с Листком-вкладышем – информацией для пациента перед приёмом лекарственного препарата Барицитиниб Фармасинтез.

Сообщите Вашему лечащему врачу обо ВСЕХ препаратах, которые Вы принимаете, включая препараты, отпускаемые по рецепту и без рецепта, витамины и биодобавки.

Некоторые лекарственные препараты при совместном применении с препаратом Барицитиниб Фармасинтез могут изменять уровень барицитиниба в крови, в результате чего Вам может потребоваться коррекция дозы препарата Барицитиниб Фармасинтез.

Сообщите лечащему врачу, прежде чем принимать препарат Барицитиниб Фармасинтез, если Вы принимаете какие-либо из следующих лекарств:

- азатиоприн, такролимус или циклоспорин – применяются для контроля иммунного ответа организма;
- пробенецид – применяется при подагре;
- лефлуномид, терифлуномид – применяются для лечения рассеянного склероза;
- ибупрофен, диклофенак – применяются для лечения болезненных и/или воспалительных состояний мышц или суставов.

Необходимо удостовериться, что приём препарата Барицитиниб Фармасинтез безопасен при Ваших заболеваниях и в сочетании с другими лекарственными препаратами,

которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.

Пациенты в возрасте 75 лет и старше могут подвергаться повышенному риску инфекций, инфаркта миокарда и некоторых видов рака. Если Ваш возраст 75 лет или старше, Ваш врач должен решить, подходит ли Вам препарат Барицитиниб Фармасинтез, или подобрать другой вид терапии.

### **Что нужно сообщить врачу перед началом приема препарата Барицитиниб Фармасинтез?**

- Информацию обо всех видах аллергических реакций, возникавших когда-либо прежде (случаи ангионевротического отёка, анафилаксии), в том числе – если у Вас аллергия на барицитиниб или другие компоненты препарата.

- Если Вы беременны или планируете беременность, а также кормите ребёнка грудью.

- Если у Вас имеются активные или хронические инфекции, туберкулёз (сейчас или в прошлом), или пониженный уровень лейкоцитов и/или нейтрофилов.

- В одном из следующих случаев: анемия, заболевание почек или заболевание печени.

- Если Вы болеете (или ранее болели) гепатитом В или С.

- Некоторые вирусные инфекции, например, вызванные вирусами опоясывающего герпеса, могут активироваться в случае применения данного лекарственного препарата. Сообщите врачу, если у вас когда-либо была такая вирусная инфекция, как опоясывающий герпес.

- Если Вы планируете вакцинацию непосредственно перед или во время терапии данным препаратом.

- Если Вам поставили диагноз злокачественного новообразования (рак).

- Если у Вас ранее были тромбы в венах ног или лёгких, если Вы недавно перенесли хирургическую операцию или иммобилизацию.

- Если у Вас был дивертикулит (воспаление толстой кишки), язва желудка или других отделов кишечника

### **ВО ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОМ БАРИЦИТИНИБ ФАРМАСИНТЕЗ**

#### **О каких нежелательных реакциях следует немедленно сообщать лечащему врачу?**

Немедленно обратитесь к врачу, если Вы испытываете какие-либо из следующих признаков и симптомов:

- повышение температуры тела, озноб, потливость, сильная усталость, длительный кашель, одышка, появление мокроты или изменение количества или цвета мокроты, боль в мышцах, горячая на ощупь кожа, покраснение или болезненность кожи, появление волдырей на теле, потеря веса, трудности или боль при глотании, диарея или боль в желудке, болезненное или учащенное мочеиспускание;

- внезапная одышка или затрудненное дыхание, боль в груди или боль в верхней части спины, отёк ноги или руки, боль в ноге или болезненность при надавливании, покраснение или изменение цвета ноги или руки;

- затрудненное дыхание или глотание, головокружение, отек лица, губ, языка и/или горла, сильный зуд кожи, появление сыпи или волдырей;

- симптомы опоясывающего герпеса, такие как болезненная кожная сыпь или волдыри.

Необходимо срочно обратиться за медицинской консультацией также в следующих случаях:

- если Вы вступали в контакт с людьми, у которых диагностирован туберкулёз или другие инфекционные заболевания (кандидоз, сепсис);

- сильная боль в груди или ощущение стеснения в груди (которые могут распространяться на руки, челюсть, шею и спину), одышка, холодный пот, головокружение или внезапная слабость;

- любое увеличение лимфатических узлов на шее, подмышках или в паху; постоянное чувство усталости; лихорадка; ночная потливость; постоянный или усиливающийся кашель; затрудненное дыхание; охриплость или свистящее дыхание; необъяснимая потеря веса;

- любой новый рост на коже или любые изменения в существующих родинках или пятнах;

- повышение температуры тела, боль в желудке или животе, кровь в стуле, изменение частоты и характера стула;

- пожелтение кожи, тошнота и рвота;

- снижение количества нейтрофилов в анализах крови (ниже  $1 \times 10^9/\text{л}$ ), лимфоцитов (ниже  $0,5 \times 10^9/\text{л}$ ), гемоглобина (менее 0,8 г/л);

- в анализах крови выявлено повышение уровня креатининфосфокиназы (КФК) более, чем в 5 раз по сравнению с верхней границы нормы.

Данный список возможных нежелательных реакций не является исчерпывающим. В случаях сомнений – пожалуйста, обсудите их с Вашим лечащим врачом.

**Другая информация (пожалуйста, заполните)**

<b>ФИО пациента</b>	
<b>ФИО лечащего врача</b>	
<b>Номер телефона лечащего врача</b>	

Дополнительно ознакомьтесь с листком-вкладышем лекарственного препарата Барицитиниб Фармасинтез на сайте Государственного реестра лекарственных средств: <https://grls.rosminzdrav.ru/GRLS.aspx>.

Также Вы можете ознакомиться с общей характеристикой лекарственного препарата Барицитиниб Фармасинтез на сайте [pharmasyntez.com](http://pharmasyntez.com) (раздел «Продукция»).

Если Вы наблюдаете у себя развитие нежелательных реакций, сообщите об этом лечащему врачу, фармацевту или другому медицинскому работнику.

О развитии нежелательной реакции Вы также можете сообщить в компанию АО «Фармасинтез-Норд» по:

- электронной почте [info-psn@pharmasyntez.com](mailto:info-psn@pharmasyntez.com)
- телефону горячей линии (24 часа) 8 (800) 100 15 50.

Сообщайте о развитии любой нежелательной реакции, даже если она не указана в инструкции по медицинскому применению препарата Барицитиниб Фармасинтез.