

## **Карточка-памятка пациента**

### **М А Ц И Т Е Н Т А Н (м а ц и т е н т а н )**

10 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Для лечения легочной артериальной гипертензии.

Лечебный центр: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. врача: \_\_\_\_\_

Номер телефона врача: \_\_\_\_\_

**Эта карта содержит важную информацию о безопасности, которую необходимо знать при лечении препаратом Мацитентан.**

**Всегда носите эту карту с собой и покажите ее любому врачу, участвующему в вашем медицинском обслуживании.**

Рекомендуемая доза препарата Мацитентан 10 мг (1 таблетка) 1 раз в день, независимо от приема пищи. Таблетку проглатывать целиком, запивая достаточным количеством воды, нельзя разжевывать, разламывать или делить. Если Вы забыли принять таблетку, ее нужно принять как можно быстрее и затем продолжить регулярный прием препарата в обычное время. Не следует принимать одновременно две таблетки препарата, чтобы восполнить пропущенную дозу.

**Для получения дополнительной информации о препарате Мацитентан, пожалуйста, внимательно прочитайте информационный листок для пациентов.**

**Если у вас есть какие-либо вопросы о вашем лечении, обратитесь к своему врачу**

Важно немедленно обратиться к лечащему врачу, если вы забеременели или испытываете какие-либо побочные эффекты во время лечения препаратом Мацитентан.

### **Беременность**

Мацитентан может нанести вред ребенку. Поэтому вы не должны принимать препарат Мацитентан, если беременны, и вы также не должны забеременеть во время лечения препаратом Мацитентан или вскоре после его прекращения. Беременность также может привести к серьезному ухудшению симптомов легочной артериальной гипертензии.

### **Контрацепция**

Вам необходимо использовать надежные методы контрацепции во время приема препарата Мацитентан. Обсудите это с Вашим лечащим врачом. Вы должны пройти тест на беременность перед лечением препаратом Мацитентан, затем тест необходимо выполнять регулярно (1 раз в месяц), пока Вы принимаете препарат Мацитентан.

### **Анализ крови на анемию и функцию печени**

Мацитентан может вызвать анемию (снижение количества эритроцитов) и может явиться причиной повреждения печени.

Вам потребуется провести анализы крови до начала лечения и периодически во время лечения, чтобы проверить:

- есть ли у вас анемия;
- правильно ли работает ваша печень

**Признаками нарушения работы печени являются:**

- тошнота
- рвота
- лихорадка
- боль в животе
- желтуха (желтушное окрашивание кожи и склер)
- темная моча
- зуд кожи выраженная усталость (вялость или утомляемость);
- гриппоподобный синдром (боли в мышцах и суставах, лихорадка)

**Если вы заметили какой-либо из этих признаков, немедленно сообщите об этом лечащему врачу или работнику аптеки. Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.**

Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

**Вы также можете сообщить о побочных эффектах напрямую:**

Российская Федерация

109012, Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Тел.: +7 (800) 550- 99- 03, +7 (499) 578-02-20

Факс:+7 (495) 698-31-18

Электронная почта: [pharm@roszdravnadzor.gov.ru](mailto:pharm@roszdravnadzor.gov.ru)

<https://roszdravnadzor.gov.ru/>

**О побочных эффектах также можно сообщить в ООО «Фармасинтез-Тюмень»:**

Россия, 625059, Тюменская обл., г. Тюмень, тракт Велижанский 7 км, д.2

Тел: 8-800-100-1550

Адрес электронной почты: [info-pst@pharmasyntez.com](mailto:info-pst@pharmasyntez.com)